

Pinot Nero

di I. Cosmo e M. Polsinelli
da "Pinot nero", in *Principali vitigni da vino coltivati in Italia - Volume I*, Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, 1960

Sinonimi (ed eventuali errati)

Borgogna nero o "Blauburgunder" in Alto Adige (Bolzano) ed in genere nei Paesi di lingua tedesca. [Per altre osservazioni si rimanda alla descrizione del Pinot Bianco, NdR].

Descrizione Ampelografica

Germoglio di 10-20 cm

Apice: mediamente espanso, cotonoso, biancastro con bordi spesso rosati.

Foglioline apicali (dalla 1a alla 3a): spiegate, cotonose, biancastre, con bordi rosa; 1a e 2a lanceolate.

Foglioline basali (dalla 4a in poi): spiegate, bollose, lanuginose, verdi di sopra con riflessi dorati, grigioverdi di sotto; seno peziolare a V; tondeggianti.

Asse del germoglio: verde, con radi peli.

Germoglio alla fioritura

Apice: mediamente espanso, cotonoso, biancastro.

Foglioline apicali: spiegate, cotonose, verdi-biancastre.

Foglioline basali: un po' ondulate, bollose, sublanuginose, verdi con riflessi dorati, rotondeggianti.

Asse del germoglio: verde con leggere sfumature rosa, curvo.

Tralcio erbaceo: di sezione trasversale leggermente ellittica, glabro, verde con sfumature brunastre.

Vitici: bifidi e trifidi, intermittenti (formula: 0-1-2-0-1-2...).

Infiorescenza: cilindro-conica, piccola.

Fiore: ermafrodita, autofertile (Cosmo, 1940).

Foglia: grandezza media, tondeggiante, per lo più trilobata; seno peziolare a V-U, seni laterali superiori a V-U non molto profondi, seni laterali inferiori assenti o poco profondi; angolo alla sommità del lobo terminale retto; lembo leggermente a coppa, spesso, con lobi leggermente a gronda, non molto marcati; pagina superiore verde scuro, bollosa, opaca; pagina inferiore verde chiaro, aracnoidea; nervature di 1°-2°-3° ordine sporgenti inferiormente, di color verde chiaro con la base rossastra; denti poco pronunciati, regolari, mucronati a base larga e margini convessi.

Picciolo: medio o corto, glabro, verde sfumato in rosso vinoso.

Colorazione autunnale delle foglie: rossa.



Figura 1: Apice di Pinot Nero.



Figura 2: Foglia di Pinot Nero.

Grappolo a maturità industriale: piccolo (lungo 12-15 cm), cilindrico, spesso alato, compatto; peduncolo corto, piuttosto grosso; pedicelli medi, sottili, verdi; cercine verrucoso, bruno; pennello piccolo, verde-rossastro.

Acino: medio, sferoide o leggermente ovale, buccia di colore blu nero, pruinosa, un po' spessa, consistente, ombelico persistente; polpa succosa, dolce, sapore semplice.

Vinaccioli: 2-3 per acino, piriformi, un po' piccoli.



Figura 3: Grappolo di Pinot Nero.

Tralcio legnoso: di media lunghezza, robusto, ramificato, di sezione ellittica, superficie striata, nodi evidenti, grigio-violacei, internodi lunghi 7-8 cm, di colore rossastro; gemme coniche, un po' arrotondate.

Tronco: abbastanza robusto.

Fenologia

Condizioni d'osservazione: vedi "Pinot bianco".

Fenomeni vegetativi

Germogliamento: medio.

Fioritura: media.

Invaiaura: un po' precoce.

Maturazione dell'uva: fine II epoca (verso la metà settembre).

Caduta delle foglie: un po' precoce.

Caratteristiche ed Attitudini culturali

Vigoria: buona.

Produzione: discreta.

Posizione del primo germoglio fruttifero: 1°-2° nodo.

Numero medio di infiorescenze per germoglio: 1-2.

Fertilità delle femminelle: scarsa.

Resistenza alle malattie ed altre avversità: un po' sensibile al marciume.

Comportamento rispetto alla moltiplicazione per innesto: normale.

Utilizzazione

Per la vinificazione.